


AVERTISSEMENTS AGRICOLES



Ministère de l'Agriculture
Service de la Protection des Végétaux
Chemin d'Artigues - 33150 CENON

Aquitaine

Dordogne-Gironde-Landes-Lot&Garonne-Pyrénées Atlantiques

BULLETIN TECHNIQUE "GRANDES CULTURES"
N° 4 DU MERCREDI 4 JUILLET 1984
(n° 11 dans la série)



(56) 86.22.75

LUZERNE PORTE-GRAINES

La totalité des parcelles doit actuellement bénéficier de la protection du premier traitement cécidomyies des fleurs, ou du second selon les dates de pré-coupe (cf bulletin n° 2 du jeudi 21 juin).

De ce fait, des sondages réalisés au filet fauchoir dans des parcelles ayant été traitées au Sumicidin 10 il y a moins de 12 à 15 jours, montrent de très faibles niveaux d'infestation tant en phytonomes qu'en punaises, négrils ou pucerons verts.

MAIS EN CRIBS

On constate actuellement une recrudescence des vols d'alucites dans les cribs de maïs. Pour limiter les populations nous recommandons de traiter les cribs avec l'un des produits suivants :

- Nuvagrain liquide (Arkovet) : 6 ml de produit commercial/m³ d'épis
- Actellic liquide (Sopra) : 8 ml " " "
- Pirigrain liquide (CGI) : 8 ml " " "

Les doses de bouillies sont calculées au m² de la surface latérale du crib :

- en pulvérisation manuelle : 20 l pour 100 m²,
- en atomisation : 10 l pour 100 m²

CEREALES A PAILLE

A l'heure de la moisson, rappelons les règles élémentaires de préservation de la qualité de la récolte.

Les insectes parasites des céréales stockées (principalement charançon du blé, tribolium, silvain, capucin des grains...) ne contaminant pas les grains au champ, mais dans leur lieu de stockage, voire dans les contenants successifs servant à la récolte ou à son transport, pour peu que ces matériels n'aient pas été soigneusement nettoyés avant leur utilisation.

.../...

On veillera donc à :

- ne pas récolter et entreposer du grain humide ou des brisures ;
- désinsectiser avant récolte le matériel de coupe et de transport ainsi que les cellules de stockage et locaux environnants, et après chaque vidange, toute cellule ayant contenu du grain, même sain ; ce traitement des locaux de stockage peut se faire au dichlorvos, iodofenphos (non autorisé sur grains), malathion, perméthrine, ou pyrimiphos-méthyl (nombreuses spécialités commerciales).
- nettoyer la moissonneuse-batteuse, les remorques, bennes, vis, engins élévateurs etc..., au grattoir ou à l'aspirateur, en ayant soin de brûler les résidus ;
- ne pas mélanger la nouvelle récolte avec du stock de l'an passé.

(C) Service de la Protection des Végétaux, 1984

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation